

こどもを  
事故から  
守る!

# 事故防止 ハンドブック



このハンドブックは、0歳から6歳（小学校に入学前の未就学児）のこどもに、予期せず起こりやすい事故とその予防法、もしもの時の対処法のポイントをまとめたものです。

こどもの周囲の大人たちが、安全な製品の選択、正しい利用により、こどもの身の回りの環境を整備して、対策を立てることで、防げる事故があります。明るく楽しい子育てと、毎日の生活のために、こどもを事故から守る正しい知識を身に付ける一助となれば幸いです。

こどもまんなか  
こども家庭庁

# 子どもの発達と起こりやすい事故

子どもは運動機能の発達とともに、いろいろなことができるようになります。その一方で、様々な事故に遭うおそれが出てきます。起こりやすい主な事故が、発生しやすい時期の目安を矢印で記載しました。

4ページ以降は、各事故について、事故が発生しやすい年齢を右記のマークで記載しています。→ 0歳～3歳くらい



4ページ以降に起こりやすい事故の注意ポイントを紹介していますので、ご覧いただき事故の予防につなげていきましょう。

発達の目安	誕生	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	
	首がすわる 足をバタバタさせる		離乳食を始める 寝返りをうつ		一人座り 寝返りをうつ	ハイハイをする 指で物をつかむ		つかまり立ち 物をつかむ		一人歩き 走る		階段を登り降りする その場でジャンプ 高い所へ登れる					
窒息・誤飲事故	<就寝時の窒息事故> ・うつぶせで寝て、顔が柔らかい寝具に埋もれる ・掛布団、ベッド上の衣類、ぬいぐるみ、スタイルなどで窒息 ・ミルクの吐き戻しによる窒息		・ベッドと壁の隙間に挟まる ・家族の身体の一部で圧迫される							4ページ						5ページ	
			・食事中に食べ物で窒息 ・おもちゃなど小さな物で窒息 ・ボタン電池、吸水ボール、磁石などの誤飲 ・医薬品、洗剤、化粧品などの誤飲 ・たばこ、お酒などの誤飲		・包装フィルム、シールなどの誤飲					5ページ						5ページ	
											・ブラインドやカーテンのひも、洗濯機への閉じ込めなどによる窒息						4ページ
転落・転倒事故	・大人用ベッドやソファからの転落 ・抱っこひも使用時の転落 ・ベビーカーからの転落		・ベビーベッドやおむつ替えの台からの転落		6ページ					7ページ							
				・椅子やテーブルからの転落		6ページ				6ページ						7ページ	
				・階段からの転落、段差での転倒								・ベランダなどからの転落 ・窓や出窓からの転落	6ページ				
												・ショッピングカートからの転落	7ページ				
												・遊具(すべり台、ジャングルジム、ブランコなど)からの転落 ・ペダルなし三輪遊具、キックスケーター等での転倒	7ページ				
車・自転車関連の事故	・チャイルドシート未使用または誤使用による事故 ・車内での熱中症																8ページ
			・車のドアやパワーウィンドウに挟まる事故								8ページ						8ページ
				・こども乗せ自転車での転倒 ・自転車に乗せた子どもの足が後輪に巻き込まれる、スポーク外傷												8ページ	
												・道路上などの事故	9ページ				
												・機械式立体駐車場での挟まれ事故	9ページ				
水まわりの事故	・入浴時に溺れる																10ページ
												・浴槽へ転落し溺れる	10ページ				
												・洗濯機、バケツや洗面器などによる事故					10ページ
												・ビニールプールやプールなどの事故					10ページ
												・海や川での事故・ため池、用水路、排水溝、浄化槽での事故					10ページ
やけど事故				・お茶、みそ汁、カップ麺などでのやけど ・暖房器具や加湿器でのやけど								11ページ					
												11ページ					
												・ライター、花火によるやけど					11ページ
挟む・切る・その他の事故	・エスカレーター、エレベーターでの事故・スマートフォン等の充電時に起きる事故 ・子どもの熱中症																13ページ
												・テーブルなどの家具で打撲					13ページ
												12ページ					
												・がまソリ、カッター、はさみなどの刃物やおもちゃでのけが	12ページ				
												・小さな物を鼻や耳に入れる	12ページ				
												・キッチン付近の包丁、ナイフでのけが					12ページ
												・ドアや窓で手や指を挟む	12ページ				
												・タンスなどの家具を倒して下敷きになる					12ページ
												・転倒によりぶら下げていた水筒が腹部にあたる事故					13ページ
												・歯磨き中に歯ブラシでの喉突きなどの事故					12ページ

# 窒息・誤飲事故

## 就寝時の窒息事故

できるだけベビーベッドを利用することで、多くの事故を避けることができる可能性があります。

### うつぶせで寝て、顔が柔らかい寝具に埋もれる

#### [注意ポイント]

- 大人用ベッドではなく、できるだけベビーベッドに寝かせ、敷布団やマットレス等の寝具は硬めのものを使用しましょう。
- 1歳になるまでは、寝かせる時は、あお向けに寝かせましょう。

0歳～1歳くらい



### 掛布団、ベッド上の衣類、ぬいぐるみ、スタイ(よだれかけ)で窒息

#### [注意ポイント]

- 寝ている子どもの顔の近くに、口や鼻を覆ったり、首に巻き付いたりする物は置かないようにしましょう。

### ベッドと壁の隙間などに挟まる

#### [注意ポイント]

- 寝ている間に動き回り、大人用ベッドと壁や後付け柵の隙間などに頭や顔が挟まるなどしないよう、できるだけベビーベッドに寝かせましょう。
- 大人用ベッドに取り付ける幼児用ベッドガードは、生後18か月未満の乳幼児には絶対に使用しないでください。



### 家族の身体の一部で圧迫される

#### [注意ポイント]

- 寝かしつけの時に、添い寝をして意図せず寝込んでしまう、また同じ寝具で就寝している際に大人の身体の一部で圧迫してしまわないように、できるだけベビーベッドに寝かせましょう。



### ミルクの吐き戻しによる窒息

#### [注意ポイント]

- 授乳した後は、げっぷをさせてから寝かせるようにしましょう。

## ブラインドやカーテンのひも、洗濯機への閉じ込めなどによる窒息 0歳～6歳くらい

#### [注意ポイント]

- ひもが首に絡まらないよう子どもの手の届かない所にクリップなどでまとめる、ソファなど踏み台になる物をひもの近くに設置しない、ひも部分がない、重さがかかるとひものつなぎ目部分が外れる、などの安全性の高い商品を選ぶ、などに注意しましょう。
- ドラム式洗濯機に入り、窒息する事故が起きています。チャイルドロック機能の利用など、子どもが入らないように工夫しましょう。



## たばこ、お酒などの誤飲

0歳～3歳くらい

#### [注意ポイント]

- たばこやお酒の誤飲は、ひどい中毒症状が出ることがあります。加熱式たばこの誤飲により内部の金属片を誤飲することがあります。
- たばこやお酒は、子どもの目に触れない場所や、手の届かない場所に保管しましょう。
- 捨てる際も袋等に入れて密封するなど、吸い殻を取り出せないようにしましょう。



## トピックス

### 乳幼児突然死症候群(SIDS)について

SIDS:Sudden Infant Death Syndromeとは、それまで元気だった赤ちゃんが、睡眠中に突然死亡してしまう病気で、窒息などの事故とは異なります。原因が分からぬ病気で、予防方法は確立していませんが、こども家庭庁によると、以下の3点に気を付けることで発症リスクの低減が期待されています。

- ①1歳になるまでは、寝かせる時はあお向けに寝かせましょう。
- ②できるだけ母乳で育てましょう。 ③たばこをやめましょう。

飲んだものによって、緊急性の高いものや吐かせてはいけないものがあります。  
16ページに「誤飲対処早見表」を掲載していますので、応急手当の際の参考にしてください。

## ボタン電池、吸水ボール、磁石などの誤飲

0歳～5歳くらい

#### [注意ポイント]

- ボタン電池の誤飲は、食道に詰まつたり胃の中になどまつたりすると重症事故につながります。ボタン電池を利用している器具は、電池が取り出せないようカバーを固定しましょう。
- 樹脂製の吸水ボールの誤飲により、腸閉塞などを起こすことがあります。
- 複数の磁石の誤飲は、磁石が腸壁を挟んでくっつき消化管穿孔(消化管に穴があくこと)や腸閉塞などを起こすことがあります。



これらの物はこどもの手の届かない、見えないところに保管しましょう。  
また、商品の対象年齢を必ず守りましょう。

## 食事中に食べ物で窒息

0歳～6歳くらい

#### [注意ポイント]

- 離乳期の間は、固くて噛むことが困難な食材(えび、貝類、おにぎりのりなど)は使用を避け、食塊の固さや切り方によってつまりやすい食材(りんご、なしなど)は柔らかくなるまで加熱するなど工夫しましょう。離乳期を過ぎ3歳頃までの間は、これらの食材は、歯の生え方や噛み碎く力、飲み込む力に応じて適度な大きさに切るなどして与えましょう。
- 0～5歳までの子どもには、固いナツ・豆類、粘着性が高く飲み込みづらい食材(もち・白玉団子など)や、弾力性があり噛み切りにくい食材(いか・こんにゃくなど)は、窒息のリスクがあるため、使用を避けましょう。球形や大きさから、気道に入り、つまりやすい食材(ミニトマト、ぶどう、さくらんぼ、個装チーズ、うずらの卵など)は、4等分して形や大きさを変えたり、皮を取り除くなど工夫しましょう。
- 食べ物を口にいれたまま、遊んだり、話したり、寝転んだりさせないようにしましょう。また、泣いている子どもをあやそうとして、食べ物を与えるのはやめましょう。眠そうなときに食事をさせることも避けましょう。



こちらもご覧ください▶



教育・保育施設等における事故防止及び  
事故発生時の対応のためのガイドライン

## 包装フィルム、シールなどの誤飲

0歳～3歳くらい

#### [注意ポイント]

- 菓子やペットボトルの包装フィルムを口に入れたり、かじったりしていると破片を誤飲・誤えんして、窒息することができます。また、年上の子どもの遊んでいるシール、パッケージについているシール等も同様です。
- 包装フィルムやシールがついている物、容器などで遊ばせないようにしましょう。



## 医薬品、洗剤、化粧品などの誤飲

0歳～3歳くらい

#### [注意ポイント]

- 医薬品や洗剤などの誤飲は、重大な症状を引き起こすおそれがあります。
- 医薬品、食品と見た目が似ている洗剤や化粧品、入浴剤などは、子どもの目に触れない場所や、手の届かない場所に保管しましょう。



## おもちゃなど小さな物で窒息

0歳～6歳くらい

#### [注意ポイント]

- 年上の子どものおもちゃには、小さな部品が含まれていることがあります。対象年齢になるまでは、子どもの手の届かない所に保管し、遊ばせないようにしましょう。
- おもちゃの購入時や利用時は、商品の対象年齢を必ず守りましょう。



# 転落・転倒事故

## ベランダなどからの転落 1歳以上

**[注意ポイント]**

1. ベランダをこどもの遊び場にしないようにし、こどもだけでベランダに出ないよう注意しましょう。
2. ベランダから身を乗り出すと転落する危険があることを教えましょう。
3. ベランダに植木鉢、椅子などの踏み台になるものを置かないようにしましょう。エアコンの室外機は手すりから60cm以上離して設置するか、上からつるしましょう。
4. こどもだけを家に残して外出することは避けましょう。



## 窓や出窓からの転落 1歳以上

**[注意ポイント]**

1. 窓に補助錠やストッパーをつけて、大きく開かないようにしましょう。
2. 窓の近くにベッドやソファーなど踏み台になるものは置かないようになります。
3. 網戸に寄りかかると破れて転落するおそれがあるので、窓を開ける幅を制限できない場合は、網戸に寄りつかれないよう柵を設置しましょう。



## 抱っこひも 使用時の転落 0歳～1歳くらい

**[注意ポイント]**

1. 抱っこひもの使用時に、物を拾うなどで、前にかがむ際は、必ずこどもを手で支えましょう。
2. おんぶや抱っこをする時や、降ろす時は、低い姿勢で行いましょう。
3. パックル類の留め具や、ベルトのゆるみ、こどもの位置など、取扱説明書を読んで、正しく使用しましょう。



## ベビーカーからの転落 0歳～2歳くらい

**[注意ポイント]**

1. ベルトは必ず、正しくしっかりと締めましょう。
2. 段差に引っかかったり、重い荷物をぶら下げていることでバランスを崩したりして転倒があるので、注意しましょう。
3. ベビーカーで電車やバスに乗る時は、周囲の状況に注意し安全を確認しましょう。



## 大人用ベッドやソファからの転落 0歳～1歳くらい

**[注意ポイント]**

1. こどもは寝ている間も寝返りをしたり、動きまわったりして、ベッドから転落し、頭部などにけがをすることがあります。軟らかすぎるクッションなどは窒息のおそれがあるため、転落防止のためであっても周りに置かないようにしましょう。
2. 寝かしつけの時に、添い寝をすることは多いと思いますが、2歳になるまでは、できるだけ大人用ベッドは使わないようにしましょう。またソファで寝かせないようにしましょう。



## ショッピングカートからの転落



**[注意ポイント]**

1. ショッピングカートの上にこどもを立たせたり、ショッピングカートで遊ばせたりしないようにしましょう。
2. ショッピングカートの幼児用座席以外にこどもを乗せないようにしましょう。
3. 注意表示等をよく確認して、安全に使用しましょう。

## ベビーベッドやおむつ替えの時の台からの転落 0歳～1歳くらい

**[注意ポイント]**

1. ベビーベッドを使用する時は、常に柵を上げて使用しましょう。
2. ベビーベッドやソファ、施設にあるおむつ交換台などの高さのある場所でおむつ替えをする時は、事前に準備し、片付けやゴミ捨てはこどもを降ろした後にしましょう。備え付けのベルトを使用しても確実な転落防止にはなりません。



## 遊具(すべり台、ジャングルジム、ブランコなど)からの転落 2歳以上

**[注意ポイント]**

1. 施設や遊具の対象年齢を守って、遊ばせましょう。
2. 6歳以下のこどもは、大人が付き添い、目を離さないように注意しましょう。
3. ひもやフードのない服装で遊ばせましょう。
4. かばんは置いて、水筒やマフラーなど引っかかる物は身に付けないで遊ばせましょう。
5. 遊具ごとの使い方を守らせ、ふざけてほかのこどもを突き飛ばさせないように教えましょう。



## 椅子やテーブルからの転落 0歳～1歳くらい

**[注意ポイント]**

1. 椅子やこども用ハイチェアの上で立ち上がり、座ってテーブルを蹴ったりさせないようにしましょう。
2. ハイチェアの安全ベルトは、必ず締めましょう。
3. 椅子で遊ばせないようにしましょう。



## 階段から転落、段差での転倒 0歳～1歳くらい

**[注意ポイント]**

1. ハイハイをする頃から、階段からの転落が起るので、転落防止の柵をつけて、閉め忘れないようにし、こどもが開けられないようにロックを掛けましょう。
2. 玄関の段差での転倒や、そのほかにつまづきやすい段差がないか注意しましょう。



## ペダルなし二輪遊具、キックスケーター等で転倒 2歳以上

**[注意ポイント]**

1. こどもが足で蹴って進むペダルなし二輪遊具や、キックスケーターは、道路交通法上、交通量の多い道路では使用できません。
2. 必ずヘルメットや膝・肘にプロテクターを着用させ、いつでも止まれる速度で使用するなど、正しい乗り方を教えましょう。
3. 坂道や転落の可能性がある場所、濡れて滑りやすい場所などの走行も大変危険ですので絶対にやめましょう。



# 自動車・自転車関連の事故

## 車のドアやパワーウィンドウに挟まれる事故

0歳～3歳くらい

### [注意ポイント]

- 車のドアやパワーウィンドウを閉める時は、子どものそばで顔や手が出ていないか安全を確認してから閉めましょう。
- 子どもが自分で開閉操作ができないように、ロック機能を活用しましょう。



## 車内での熱中症

0歳～6歳くらい

### [注意ポイント]

- 子どもだけを車内に残しておくことは大変危険です。予想外に車内温度が上昇することがあります。その結果、熱中症に陥り、死に至ることもあります。
- 短時間でも子どもは熱中症に陥ることがあります。大人の感覚とは異なるので注意が必要です。



## チャイルドシート未使用または誤使用による事故

0歳～6歳くらい

### [注意ポイント]

- 抱っこ乗車は危険です。子どもを抱っこしたままシートベルトを締めることも危険です。
- 短時間の乗車であっても、チャイルドシート（※ジュニアシートを含みます）を使用しましょう。
- 6歳になるまでは、必ずチャイルドシートを使用しましょう。6歳になっても、シートベルトを正しく使える体格（目安は身長150cm以上）になるまではチャイルドシートを使用しましょう。
- チャイルドシートは取扱説明書をよく読んで、座席にしっかりと取り付け、正しく使用しましょう。



## こども乗せ自転車での転倒

0歳～6歳くらい

### [注意ポイント]

- 都道府県公安委員会規則により、子どもを乗せることは、未就学児で、幼児用座席を設置した場合に認められています。
- 座席に乗せる前にヘルメットを着用させ、乗せた後は必ずシートベルトを確実に締めましょう。
- 子どもを乗せたまま自転車を離れないようにしましょう。
- 子どもを2人乗せる時は、転倒防止のため、「乗せる時は、後部座席から前部座席」、「降ろす時は、前部座席から後部座席」の順番を守りましょう。
- 抱っこひもで子どもを前抱っこしながら運転することは道路交通法違反です。おんぶをしていても走行中の死亡事故が発生しているので、できるだけ避けるようにしましょう。
- 自転車や幼児用座席に不具合がないか、定期的にチェックしましょう。



## 自転車に乗せた子どもの足が後輪に巻き込まれる、スポーク外傷

0歳～6歳くらい

### [注意ポイント]

- 都道府県公安委員会規則により、子どもを乗せることは、未就学児で、幼児用座席を設置した場合に認められています。
- 幼児用座席を使用し、シートベルトやヘルメットを着用させましょう。
- 幼児用座席がリコールされていないか確認しましょう。後輪へのスカート等の巻き込みを防止するドレスガードを設置すると足の巻き込み防止に有効です。



## 道路上などの事故

1歳以上

### [注意ポイント]

- 子どもと歩く時は、手をつなぎ、白線の内側を歩きましょう。また、歩道を歩くときは、大人が車道側を歩くようになります。
- 道路上に飛び出しをしないことなど、交通事故の危険や交通ルールについて教えましょう。
- 道路越しに子どもに声を掛けると、飛び出しおの危险があるので、声を掛けないようにしましょう。
- 駐車場はとても危険な場所です。車の乗り降りの際は特に注意を払ってください。死角が多く、飛び出す危険性もありますので、手をつないでください。



## 機械式立体駐車場での挟まれ事故

1歳～6歳くらい

利用者が駐車装置を操作する機械式立体駐車場で、機械に子どもが挟まれる事故が起きています。

### [注意ポイント]

- 駐車装置を操作中は装置から離れず、子どもが近づかないよう注意しましょう。
- 子どもには「駐車場では遊ばない」「装置に触らない」「機械の中に入らない」などの注意を徹底しましょう。

## トピックス

### 安全な製品を選び、取扱説明書をよく読んで使用しましょう。

子どもが使う製品は、対象の年齢や年齢に合ったものを選び、取扱説明書や使用上の注意をよく読んで、正しく使用しましょう。また、安全に配慮された製品には様々なマークがあります。マークの意味を知って、製品選びに役立てましょう。



PSCマークはProduct(製品)、Safety(安全)、Consumer(消費者)を表し、国の定めた安全基準検査に合格した製品に付いています。対象製品には、製造又は輸入業者による安全基準に適合しているかどうかの自己確認が義務付けられている「特別特定製品以外の特定製品」と、当該自己確認に加え第三者機関の検査が義務付けられている「特別特定製品」があります。特別特定製品には乳幼児用ベッドやライターも指定されています。



SGマークはSafe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したと認証されたことを示すマークです。万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。SGマークの表示対象のこども向け製品には、ベビーカー、すべり台、乳幼児用ベッド、抱っこひも、幼児用ベッドガードなどがあります。



STマークは、14歳未満のこども向け玩具に付けられるマークで、「安全面について注意深く作られたおもちゃ」として玩具業界が推奨するものです。一般社団法人日本玩具協会が策定した玩具安全(ST)基準に適合している玩具にはSTマークが表示されています。また、STマーク付きの玩具には、対象年齢が記載されています。対象年齢が低い玩具は、喉に詰まらない大きさである、部品が外れにくい、尖った部分がない等、安全性をより配慮した設計になっています。

# 水まわりの事故

## 入浴時に溺れる

0歳～5歳くらい

### [注意ポイント]

- 大人が洗髪する際には、こどもを浴槽から出しましょう。
- 浮き輪の使用中でも溺れる事故が発生しています。
- 保護者が目を離す状況で使用するのはやめましょう。
- お風呂から上がる際には、こどもを先に浴槽・浴室から出しましょう。



## 浴槽へ転落し溺れる

0歳～2歳くらい

### [注意ポイント]

- こどもが浴室に入ってしまい、浴槽へのぞき込み転落し、溺れることがあります。
- 入浴後は、浴槽の水を抜き、浴室には外鍵を付けてこどもが入れないようにしましょう。



## 洗濯機、バケツや洗面器などによる事故

0歳～5歳くらい

### [注意ポイント]

- 使用後の洗濯機、バケツ、洗面器に水を溜めたままにしないようにしましょう。
- 洗濯機にはチャイルドロックをかけて蓋を開けられないようにしましょう。



## ビニールプールやプールでの事故

1歳以上

### [注意ポイント]

- 水深の浅い場所でも、こどもが溺れてしまうことがあります。
- プールで遊ぶ時は、必ず大人が付き添い、こどもから目を離さないようにしましょう。



## 海や川での事故

2歳以上

### [注意ポイント]

- こどもだけ海や川などで遊ぶことがないよう注意しましょう。
- 遊ぶ時はライフジャケットを着用させ、必ず大人が付き添うようにしましょう。



## ため池、用水路、排水溝、浄化槽での事故

2歳以上

### [注意ポイント]

- ため池、用水路、排水溝、浄化槽など、転落や溺れる可能性がある危険な場所に気付いたら、管理者へ柵の設置等を要請しましょう。
- 危険な場所で遊ばないよう日頃から話しておきましょう。



# やけど事故

## お茶、みそ汁、カップ麺などのやけど

0歳～2歳くらい

### [注意ポイント]

- こどもの手が届かないように、高温の飲み物や汁物をテーブルに置くときは中央に置き、またこどもを抱っこしたまま扱わないようにしましょう。
- テーブルクロスやランチョンマットは、こどもが引っ張って、その上の載った容器を倒す原因になりやすいので使わないようにしましょう。



## 電気ケトル、ポット、炊飯器でのやけど

0歳～2歳くらい

### [注意ポイント]

- 電気ケトルなどにつかり立ちをしたり、コードを引っ張ったりして倒してしまい、熱湯を浴びてやけどをすることがあります。
- 電気ケトルやポットは倒れても中身がこぼれない製品を選びましょう。コードも含めこどもの手の届かない場所に設置しましょう。
- 炊飯器から出る蒸気に触れてやけどをすることがあるので、キッチンのレイアウトを見直し、こどもの手の届かない位置に設置しましょう。
- ウォーターサーバーの熱湯によるやけども起きていますので、チャイルドロックを確実にかける、また、こどもがチャイルドロックを外せないことを確認するなど注意が必要です。



## 暖房器具や加湿器でのやけど

0歳～2歳くらい

### [注意ポイント]

- 床に置くタイプの暖房器具は、こどもの手が届かないよう安全柵などで囲みましょう。
- 湯たんぽや電気カーペットなどは、長時間皮膚が同じ場所に触れて低温やけどをすることがありますので、長時間使用しないようにしましょう。
- 加湿器から出る蒸気に触れたり、加湿器を倒して熱湯を浴びたりしてやけどをすることがあります。加湿器は転倒しても熱湯がこぼれない製品を選び、使用時は、ベビーゲートを活用しましょう。



## 調理器具やアイロンでのやけど

0歳～2歳くらい

### [注意ポイント]

- フライパンやなべなどの調理器具は、調理中だけでなく調理後も高温があるので、こどもに触れさせないようにし、取っ手は奥に向けましょう。キッチンにゲートを設置してこどもがキッチンに入れないようにしましょう。
- アイロンやヘアアイロンを使用する際はこどもを近づけないようにし、使用後はコードを含めて、こどもの手の届かないところに置き、なるべく早く片付けましょう。



## ライターや花火でのやけど

2歳～6歳くらい

### [注意ポイント]

- 花火をする際は、燃えやすいものではなく、広くて安全な場所で行い、必ず大人が付き添いましょう。花火は風下に向ける、風が強い場合は花火で遊ばせない、説明書をよく読み注意事項を守る、など注意しましょう。
- 使い捨てライターによる火災事故防止のため、こどもが操作できないような幼児対策(チャイルドレジスタンス)機能が施された、PSCマーク(※9ページのトピックス参照)付きのライターを使用し、こどもの手の届かないところに保管しましょう。



# 挟む・切る・その他の事故

## カミソリ、カッター、はさみなどの刃物やおもちゃでのけが

0歳～2歳くらい

### 【注意ポイント】

- 洗面台や風呂場にあるカミソリは使用したら、すぐにこどもの手の届かない所に保管しましょう。
- 大人や年上のこどもが文房具として使用するカッターやハサミも同様にして保管しましょう。



## テーブルなどの家具で打撲

0歳～3歳くらい

### 【注意ポイント】

- 転倒してテーブルなどの家具の角に顔や頭をぶつけて、けがをすることがあります。
- 角の丸い家具を選ぶ、クッションテープを取り付けるなどして、ぶつかったりけがをしないように工夫をしましょう。



## キッチン付近の包丁、ナイフでのけが

1歳～6歳くらい

### 【注意ポイント】

- まな板に置いた包丁など、刃物を使用したらすぐに収納場所に片付けましょう。
- 収納場所の扉や引き出しにはチャイルドロックを付けるなどの工夫をしましょう。
- キッチンは危険なものがたくさんあるので、ベビーゲートなどでこどもを入れないようにしましょう。



## タンスなどの家具を倒して下敷きになる

1歳～6歳くらい

### 【注意ポイント】

- タンスなどの家具にぶら下がったり、引き出しを開けてよじ登ったりして家具が倒れ、下敷きになることがあります。
- タンスなどの家具は固定し、引き出しや開き扉にはストップバーを付け、家具で遊ばせないようにしましょう。



## 歯磨き中に歯ブラシでの喉突きなどの事故

1歳～6歳くらい

### 【注意ポイント】

- 歯磨き中は、保護者がそばで見守り、歯ブラシを口にくわえたり、手に持ったまま歩き回ったりさせず、床に座らせて歯磨きをさせましょう。
- こども用歯ブラシは、喉突き防止カバーなどの安全対策を施したものを使いましょう。
- 歯磨き中に転倒すると、喉の奥に突き刺さり、脳まで達することもあり、大変危険です。
- 箸やフォークなど、喉突きの危険性がある日用品も、口に入れたまま歩いたり、走ったりさせないようにしましょう。



## エスカレーター、エレベーターでの事故

0歳～6歳くらい

### 【注意ポイント】

- 転倒・転落し、こどもと周囲の人も傷つける可能性があるため、ベビーカーでのエスカレーターの利用はやめましょう。
- エスカレーターをこどもが利用する際は、必ず大人が手をつなぎ、靴やサンダル、衣類の裾などが挟み込まれないよう、黄色い線の内側に立ちましょう。危険ですので、エスカレーターにこどもだけで近づかせないようにしましょう。
- エレベーターでは、戸袋に手を引き込まれたり、扉に挟まれたりしないよう注意しましょう。



## 転倒によりぶら下げていた水筒が腹部にあたる事故

3歳以上

気温が高く水分補給が欠かせない時期は、こどもが水筒を持ち歩く機会も多く、転倒した際に首や肩に掛けている水筒がお腹に当たり、内臓を損傷する等の事故が起きています。

### 【注意ポイント】

- 水筒はなるべくリュックサック等に入れましょう。
- 水筒を首や肩に掛けているときに走らないようにしましょう。
- 遊具等で遊ぶ場合は、水筒を置いて遊ぶようにしましょう。

## こどもの熱中症

0歳以上

こどもは背が低く、大人より高温の環境下にさらされています。また、熱中症の異変に気づきにくく、体の不調を訴えることや服などで暑さの調節をうまくできないこともあります。注意が必要です。

### 【注意ポイント】

- 暑さ指数などの熱中症予防のための情報を活用しましょう。
- こまめに休憩をとらせたり、水分・塩分の補給や通気性の良い服装や帽子の着用をすすめましょう。
- 汗のかき方、体温、顔色や泣き方などを気にかける、声をかけるなどにより、こどもの状況を確かめましょう。

こちらもご覧ください▶



みんなで見守り  
「こどもの熱中症」を  
防ぎましょう!

## スマートフォン 0歳～6歳くらい等の充電時に起きる事故

スマートフォンの充電器に触れて、感電、やけど等に至る事故が起きています。

### 【注意ポイント】

- スマートフォン等の充電器は、こどもの手の届かないところに保管しましょう。
- 充電器をコンセントに差し込み充電する際に、コンセント部分には、こどもが容易に取り外せないタイプのカバーを設置することを検討しましょう。

## もしもの時の応急手当方法

### ★ 打撲をしてしまった時

#### ■頭の打撲の場合

- 傷口から出血している時は、傷口を閉じるようにガーゼで圧迫し、安静にして様子をみましょう。
- 意識がない、出血がひどい、繰り返し嘔吐があるときには、救急車を呼ぶか、至急病院を受診しましょう。
- 顔色が悪く元気がないときは、小児科や脳外科を受診しましょう。意識があって元気なときでも、1日～2日は安静にして様子をみます。
- こぶができる程度なら、安静にして冷たいタオル等で冷やします。

#### ■身体の打撲の場合

- 腕や足などを打った時は、冷たいタオルなどで冷やします。
- おなかを強く打った時は、衣類を緩めて、安静にして、病院を受診しましょう。

#### ■腕や足の骨折や脱臼の可能性がある場合

- 添え木などで固定し、その部分を動かさないようにして、病院を受診しましょう。

### ★ 出血した時

傷の処置で大事なのは止血です。まずは水で傷を洗います。これは感染防止になります。傷口の深さと大きさを確認してガーゼを当てて止血します。それでも血が止まらず、出血がひどい時は、止血しながら病院を受診しましょう。

# もしもの時の「応急手当方法」

## ★ 心肺蘇生法

病気やけがにより突然心臓が止まったり、溺れたりした場合、一刻も早い手当てが必要です。人間の脳細胞は数分間血液が流れず酸素が届かなくなると、二度と機能が回復しないからです。119番通報をしてから救急車が来るまでには最低でも数分かかるので、その間の応急措置が命を救います。まずは人を呼び、周りに人がいない場合は119番しましょう。119番したら電話をハンズフリー設定にして、救急隊の指示に従って以下の処置を行います。胸骨圧迫と人工呼吸の回数は30:2とし、この組み合わせを救急隊員と交代するまで繰り返します。

### <胸骨圧迫(心臓マッサージ)>

意識がなく呼吸が停止している場合は、直ちに胸骨圧迫による心肺蘇生を開始します。幼児でも乳児でも、胸の厚さが3分の1くらい沈む強さで、1分間に100~120回のスピードで圧迫します。



胸骨圧迫(心臓マッサージ)  
(乳児)

- 幼児の場合: 胸骨の下半分を、手のひらの根元で押します。
- 乳児の場合: 左右の乳頭を結んだ線の中央で少し足側を、指2本で押します(右図)。

### <人工呼吸>

あお向いてして、頭を後ろに反らし、同時に頸の先を上に持ち上げ、気道を確保します。

- 幼児の場合: 鼻をつまみ、口と口をくっつけて息を吹き込みます。
- 乳児の場合: 口と鼻と一緒に覆い、胸が軽く上がる程度まで息を吹き込みます。

こちらもご覧ください▶



心肺蘇生法(小児用)



心肺蘇生法(乳児用)

(東京消防庁)

## ★ AED(自動体外式除細動器)

AEDは、心臓に電気的な刺激を与えて正常のリズムを取り戻す機械です。近くにAEDがあれば取り寄せを依頼し、届いたら電源を入れて、音声に従いつつ表示されているように電極パッドを貼り、その音声に従って操作します。効果がない場合は胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を繰り返し、以後2分おきにAEDを操作します。



## ★ 熱中症の応急手当

- 涼しい場所や日陰のある場所へ移動し、衣服を緩め、安静に寝かせる。
- エアコンをつける、扇風機、うちわ等で風をあて、体を冷やす。
- 首の周り、脇の下、太ももの付け根など太い血管の部分を冷やす。
- 飲めるようであれば水分と塩分をこまめに取らせる。



### [予防のポイント]

- ・ 部屋の温度と湿度をこまめにチェック!
- ・ 室温28°Cを目安に、エアコンや扇風機を上手に使いましょう。
- ・ 暑さに慣れていないうちは無理して運動をしないようにしましょう。
- ・ のどが渴かなくてもこまめに水分と塩分補給をさせましょう。
- ・ 外出の際は体を締め付けない涼しい服装で、日よけ対策も。
- ・ 無理をせず、こまめに休憩をしましょう。
- ・ 短時間であっても絶対に車内にこどもを放置しないでください。

## ★ 異物を飲み込み喉に詰まってしまった時

119番通報を誰かに頼み、直ちに以下の方法で詰まった物の除去を試みます。1歳以上の幼児には、まず「背部叩打法」(図1)を行い、異物が除去できなかった場合は「腹部突き上げ法」(図2)を行います。1歳未満の乳児には、「背部叩打法」(図3)と「胸部突き上げ法」(図4)を数回ずつ交互に行いましょう。意識がない場合は、心肺蘇生を行います。

### <背部叩打法(はいぶこうだほう)>

幼児にはこどもの後ろから片手を脇の下に入れて、胸と下あご部分を支えて突き出し、あごをそらせます。片手の付け根で両側の肩甲骨の間を強く迅速に叩きます(図1)。乳児には片腕にうつぶせに乗せ顎を支えて、頭を低くして、背中の真ん中を平手で何度も連続して叩きます(図3)。

こちらもご覧ください▶▼



背部叩打法  
(成人・小児用)



背部叩打法  
(乳児用)  
(東京消防庁)



図1: 背部叩打法  
(幼児)



図2: 腹部突き上げ法  
(幼児)

### <胸部突き上げ法(きょうぶつきあげほう)>

片手で体を支え、手の平で後頭部をしっかりと支えます。心肺蘇生法の胸部圧迫と同じやり方で圧迫しましょう(図4)。

こちらもご覧ください▶



胸部突き上げ法  
(乳児)  
(東京消防庁)



図3: 背部叩打法  
(乳児)



図4: 胸部突き上げ法  
(乳児)

### <腹部突き上げ法(ふくぶつきあげほう)>

幼児は、後ろから両腕を回し、みぞおちの下で片方の手を握り拳にして、腹部を上方へ圧迫します(図2)。

こちらもご覧ください▶



腹部突き上げ法  
(東京消防庁)

◆ 救命講習は、お近くの消防署などで受講できます。

## ★ やけどをしてしまった時

やけどをしてしまったら、すぐに10分~20分以上冷やしましょう。刺激を避けるため、容器に溜めた水で冷やすか、水道水・シャワーを直接当てないようにしましょう。服の上から熱湯などがかった場合は、脱がさずに服の上から冷やしてください。

- 全身の広い範囲・顔面などのやけどの場合:

すぐに救急車を呼びましょう。

- やけどの範囲が片足、片腕以上の広範囲にわたる場合:

救急車を呼ぶか、至急病院を受診しましょう。

- やけどの範囲が手のひら以上の場合や水膨れの場合:

潰さないようにして、病院を受診しましょう。

なお、市販の冷却シートは、やけどの手当てには使えません。

電気カーペットなどによる低温やけどは、見た目より重症の場合がありますので、症状が悪化したり、こどもが痛がることが続いたりなどした場合には病院を受診しましょう。



# 誤飲対処早見表

飲んだものによって、緊急性の高いものや吐かせてはいけないものがあります。

症 状	救急車を呼ぶ場合  ■ 苦しそうな呼吸 ■ 窒息・顔色が青白い ■ けいれん ■ ぐったりしてよびかけてもぼんやりしている
症 状	急いで受診 (このような場合) (は救急車でも)  ■ 突然咳き込み始めた ■ 声がかすれている ■ ゼーゼー、ヒューヒューした呼吸 ■ 吐く、下痢、腹痛など



飲 ん だ も の	救急車を呼ぶ場合  ◆灯油、ベンジン、除光液、農薬、殺虫剤、ネズミ駆除剤
	急いで受診 (症状がなくても)  ◆ボタン電池 ◆鋭利な異物(ヘアピン、針など) ◆磁石 ◆洗剤(トイレ用スタンプ、液体洗剤)・吸水性樹脂・水で膨らむビーズ・芳香香剤・消臭剤・防虫剤・漂白剤 ◆たばこ(吐かせる) ◆薬(お薬手帳があれば持参) ◆コインやおもちゃ等
	家で様子を見る 診療時間内に受診  ◆少量のインク、クレヨン、絵の具、粘土、化粧品(口紅・ファンデーション)、石けん (心配な場合は電話などで相談)

## ■ (公財)日本中毒情報センター 中毒110番 ■

化学物質(たばこ、家庭用品など)、医薬品、動植物の毒などによる中毒事故が実際に起きて、どう対処したらよいか迷った場合は相談してください。

◆大阪中毒110番(24時間対応)

◆072-727-2499

◆つくば中毒110番(24時間対応)

◆029-852-9999

## ■子ども医療電話相談事業「#8000」(厚生労働省)

こちらもご覧ください▼



夜間・休日の子どもの症状にどのように対処したらよいか、病院を受診したほうがよいのかなど判断に迷ったときに、小児科医師・看護師に電話で相談できます。

※お住まいの都道府県によって、実施されている時間帯が異なります。



## ■全国版救急受診アプリ「Q助」(総務省消防庁)



該当する症状及び症候を画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応(「今すぐ救急車を呼びましょう」、「できるだけ早めに医療機関を受診しましょう」「緊急ではありませんが医療機関を受診しましょう」又は「引き続き、注意して様子を見てください!」)が表示されます。

<https://www.fdma.go.jp/mission/enrichment/appropriate/appropriate003.html>



## ■こどもを事故から守る!事故防止ポータル



ポータルサイトでは、子どもの事故防止に関する注意喚起などの様々な情報を発信しています。  
このハンドブックのWEB版も御活用ください。

<https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety-actions/>



## ■消費者庁ウェブサイト こどもの事故防止関連ページ

子どもの事故防止に関する注意喚起等の公表資料やメールマガジン、X(旧Twitter)などの配信情報等をご案内しています。

[https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer\\_safety/child](https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/child)



## ■消費者庁 リコール情報サイト

製品回収や無償修理等の情報を提供しています。

<https://www.recall.caa.go.jp/>

