



予防接種スケジュール

大切なお子様をVPD（ワクチンで防げる病気）から守るためには、接種できる時期になったらできるだけベストのタイミングで、忘れずに予防接種を受けることが重要です。かかりつけ医と相談のうえ予防接種のスケジュールを立てましょう。



ワクチン名			0歳	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	1歳1か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳	11歳	12歳	13歳	14歳	
定期	B型肝炎	不活化			①	②				③																				
			0歳のうちに3回接種 ①-②の間は27日以上、①-③の間は139日以上あける																											
定期	ロタリックス (ロタウイルス1価)	生																												
定期	ロタテック (ロタウイルス5価)	生			①	②																								
			①は8週～14週6日を推奨 1価:27日以上あけて2回接種 5価:27日以上あけて3回接種																											
定期	小児用肺炎球菌	不活化			①	②	③																							
			※初回接種が生後7か月以上経っている場合、接種回数が変わります。																											
			④ ①-②-③の間は27日以上あける ③-④の間60日以上あけ、1歳～1歳3か月で接種																											
定期	5種混合	不活化			①	②	③																							
			生後2か月～7か月に至るまでに開始し、①-②-③の間は20～56日あける ③-④の間は6～18か月あける																											
			DT ①																											
定期	BCG	生								①																				
			1歳前日までに接種 標準的には生後5か月から8か月																											
定期	麻しん風しん混合	生																												
			① ①は1歳以上2歳未満で接種																											
			② ②は5歳以上7歳未満の年長児で接種																											
任意	おたふくかぜ	生																												
			① 2回接種を推奨 ①は1歳以上で接種																											
			② ②は標準的には5歳以上7歳未満で接種																											
定期	水痘	生																												
			① 1歳以上3歳未満で2回接種 ①-②の間は3か月以上あける																											
定期	日本脳炎	不活化																												
			①と②は3歳で6日以上あけて2回接種 ②から6か月以上あけて③を接種 ③は標準的には4歳で接種																											
			① ② ③																											
			④ 9歳以上13歳未満																											
任意	インフルエンザ	不活化																												
			毎年秋(10月～11月頃)に接種 生後6か月から接種可能																											
定期	サーバリックス (ヒトパピローマウイルス2価)	不活化																												
定期	ガーダシル (ヒトパピローマウイルス4価)	不活化																												
			小学校6年生～高校1年生女子 標準的には中学1年生 2価:①-②の間は1か月、①-③の間は6か月あける 4価・9価:①-②の間は2か月、①-③の間は6か月あける																											
			① ② ③																											
定期	シルガード (ヒトパピローマウイルス9価)	不活化																												

定期：定められた期間内に接種する場合は原則として無料(公費負担)

任意：接種費用は原則として自己負担

定期予防接種の対象年齢

任意接種の接種ができる年齢



小学校6年生～高校1年生女子 標準的には中学1年生
2価:①-②の間は1か月、①-③の間は6か月あける
4価・9価:①-②の間は2か月、①-③の間は6か月あける

① ② ③

※ 5種混合：従来の4種混合にヒブワクチンが加わったワクチンです(令和6年4月1日～定期予防接種開始)