

予防接種名		対象者（ ）内は標準的な接種年齢	回数	接種間隔・注意事項等	
経口生	ロタウイルス	ロタリックス :生後6週～24週	2回 3回	27日以上の間隔で2回または3回接種 ※腸重積症の好発時期を避けるため、 <u>初回接種は生後14週6日までに</u> 受けてください。	
		ロタテック :生後6週～32週			
不活化	B型肝炎	1歳未満（生後2か月～9か月未満） ※母子感染予防の対象児は、定期予防接種の対象外です。		3回	27日以上あけて2回目を接種 1回目から139日（20週）以上あけて3回目を接種
不活化	小児用肺炎球菌 （15価・20価）	生後2か月～5歳未満 【初回】 （生後2か月～7か月未満） ※開始年齢（①②③④）に よって接種回数が 異なります	①初回を生後2か月～7か月未満 に開始	初回 3回	27日以上の間隔で1歳になるまでに3回接種 ※ただし、初回接種2回目が生後12か月を超えた場合3回目は 行わない。（追加接種は可能）
				追加 1回	初回接種終了後60日以上あけて、1歳以降 （標準的には1歳から1歳3か月まで）に接種
			②初回を生後7か月～1歳未満に 開始	初回 2回	27日以上の間隔で2歳になるまで （標準的には1歳まで）に2回接種
				追加 1回	初回接種終了後60日以上あけて1歳以降に接種
			③初回を1歳～2歳未満に開始	2回	60日以上の間隔で2回接種
			④初回を2歳～5歳未満に開始	1回	
不活化	5種混合 （ジフテリア・百日咳・ 破傷風・不活化ポリオ・ヒブ）	生後2か月～7歳6か月未満 （生後2か月～7か月未満で接種開始）	1期 初回 3回	20日以上の間隔 （標準的には20～56日の間隔で）3回接種	
			1期 追加 1回	1期初回（3回）接種終了後6か月以上 （標準的には初回接種終了後6～18か月）あけて接種	
注射生	BCG	1歳未満（生後5か月～8か月未満）	1回	ステロイド剤（軟膏を含む）を使用している方は かかりつけ医へご相談ください	
注射生	MR（麻しん・風しん混合） または 麻しん・風しん	1歳～2歳未満	1期 1回	原則 MR（麻しん風しん混合）ワクチンでの接種	
		次年度に小学生になる5歳以上7歳未満の年長児	2期 1回		
注射生	水痘（水ぼうそう）	1歳～3歳未満（1回目：1歳～1歳3か月） ※水痘にすでにかかったことのある方は対象外です。	2回	3か月以上の間隔 （標準的には6か月～12か月）で2回接種	
不活化	日本脳炎	生後6か月～7歳6か月未満 【初回】（3歳～4歳未満） ※流行地域への渡航や国内でも感染が確認された地域に 居住する等の感染リスクが高い小児は生後6か月からの接 種が推奨されています。	1期 初回 2回	6日以上の間隔 （標準的には6日～28日の間隔）で2回接種	
			1期 追加 1回	初回接種終了後6か月以上 （標準的には約1年後）あけて接種	
		9歳～13歳未満	2期 1回	標準的には9歳～10歳	
不活化	2種混合（DT） （ジフテリア・破傷風）	11歳～13歳未満	2期 1回	標準的には11歳～12歳	
不活化	子宮頸がん 予防ワクチン （HPVワクチン）	小学6年生～高校1年生相当の女子 （中学1年生）	シルガード9 （9価ワクチン） ※接種年齢等により接種間隔・回 数が 異なります。	1回目を15歳 未満で接種 2回 1回目を15歳 以上で接種 3回	2回目：1回目の接種から6か月後 2回目：1回目の接種から2か月後 3回目：1回目の接種から6か月後